



ภาวะเลือดออกในช่องสมองระหว่างเนื้อสมองกับเยื่อหุ้ม
ผู้ป่วยกว่า

10-15% เสียชีวิตก่อนถึงรพ. 40%เสียชีวิตใน 1สัปดาห์ อีก
ครึ่งหนึ่งเสียชีวิตใน 6เดือน มากกว่า 1ใน3ผู้รอดชีวิตมี

ปัญหาการสมอง กลุ่มคนอายุ 50ปีในผู้หญิง เสี่ยงที่จะมี

หลอดเลือดแตกในช่องเยื่อหุ้มสมองสูง เนื่องจากการที่จะพบหลอดเลือดสมองโป่ง
พองที่พร้อมแตกก่อนโดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการเป็นเรื่องที่ยากและไม่สามารถป้องกันได้



สาเหตุ

เกิดจากการแตกของหลอดเลือดโป่งพองในสมองหรือหลอดเลือด
เล็กที่ผิดปกติAVM หรือความผิดปกติหลอดเลือดตั้งแต่กำเนิด

หรือ ศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรง จากอุบัติเหตุต่างๆ การสูบบุหรี่
โคเคน แอลกอฮอล์ เป็นเวลานานๆยังเสี่ยงให้เกิดหลอดเลือด

เลือดในสมองโป่งพอง แม้กระทั่งความดันสูง หลอดเลือดผิดปกติ ไชมันพอกตับ
มะเร็ง การติดเชื้อ มีผลต่อการแตกของหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนี้




อาการ

รู้สึกปวดหัวมากที่สุดในชีวิตไม่เคยปวดแบบนี้มา

ก่อน การรู้สึกตัวลดลง เริ่มขยับไม่ได้ ไม่รับรู้
อารมณ์ความรู้สึก สับสน ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้

อาเจียน ชัก คอแฉะ การมองเห็นมีปัญหา



วินิจฉัย

จากประวัติการรักษาและการตรวจร่างกายทางระบบประสาท
CT MRI ECG รวมถึงประเมินHunt-Hess scale โดย
แพทย์

การรักษา

เป้าหมายคือ ลดปวด บวม และการหดตัวของหลอดเลือดสมอง บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน ป้องกันชักหรือเลือดออกซ้ำ และภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมา ผู้ป่วยพักรักษาตัวในห้องไอซียูสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด พ่าตัดทำก่อนลิ่มเลือดออก ลดแรงดันในสมอง ให้ยาระบบขับถ่ายทำงานดีป้องกันการเพิ่มแรงดันในสมอง ยาลดความดัน ยาลดความกังวลหรือยาเกินชัก รวมถึงให้ออกซิเจนและสารน้ำให้เพียงพอ



ควรไม่ควร

- ✓ ควรรีบโทรแจ้งรถพยาบาลหากมีอาการเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองฉบับพลับ
- ✓ ควรทราบเกี่ยวกับข้อมูลของโรคและการปฏิบัติตัว
- ✓ ควรมาตามนัดแพทย์



- ✗ ไม่ควรสูบบุหรี่
- ✗ ไม่ควรพลาดนัดแพทย์

